

Tratamento da assimetria facial causada pela hiperplasia condilar

Mariana Ferreira Silva Ventura,¹ Isadora Oliveira Corrêa,¹ Lenira Peloso Leite,¹ Luiza Javoski Navegantes,¹ Marcelo José Pinheiro Guedes de Uzeda²

¹Faculdade de Odontologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil

²Departamento de Odontoclínica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil

venturamariana@id.uff.br

Objetivo: a hiperplasia condilar unilateral é uma condição rara do desenvolvimento ósseo causada pela hiperatividade do centro de crescimento que resulta em um crescimento excessivo e autolimitado do côndilo mandibular. Caracteriza-se e pelo alongamento progressivo do processo condilar levando a características como assimetria facial, alongamento do terço inferior da face, má oclusão e ocasionalmente disfunção temporomandibular. Diante das formas de tratamento, o preparo ortodôntico associado à cirurgia ortognática e a condilectomia apresentam resultados satisfatórios. **Relato de Caso:** caso clínico de um paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, portador de hiperplasia condilar unilateral com assimetria facial severa, protru-

são mandibular e desvio do mento. O tratamento foi realizado no Hospital Federal dos Servidores do Estado através de cirurgia ortognática maxilomandibular com mentoplastia associada à condilectomia alta, planejada previamente utilizando modelos estereolitográficos. A condilectomia resultou na remoção do centro responsável pela hiperatividade condilar permitindo um segundo tempo cirúrgico para correção da deformidade esquelética com melhora estético-funcional do paciente. **Conclusão:** o mesmo se encontra em controle pós-operatório de seis anos, sem recidiva e com um padrão de oclusão satisfatório.

Palavras-chave: Deformidade dentofacial; Assimetria facial; Estereolitografia.