

Pacientes sob efeito de anticoagulante como o cirurgião-dentista deve proceder

Isis Barroso,¹ Fabiano Silva,¹ Felipe Basilio,¹ Arthur Scharra,¹ Marcelo Ventura²

¹Curso de Odontologia, Universidade Iguaçu, RJ, Brasil

²Curso de Odontologia, Universidade Iguaçu, RJ, Brasil

isisbarroso17@gmail.com

Objetivo: temos como objetivo o aconselhamento do profissional quanto a suspensão dos anticoagulantes antes do tratamento odontológico arriscado, diminuindo sangramento. Atualmente sabe-se que, caso o procedimento não for complexo e com pouco sangramento, não necessita suspender o anticoagulante. **Revisão de Literatura:** com o índice de doenças cardiopatas, muitos pacientes utilizam medicamentos como precaução ou terapêutica. Assim, usuários de anticoagulantes necessitam de tratamento odontológico dia após dia, logo, deve-se ter uma análise do paciente, para o procedimento ocorrer corretamente. Muitos casos, quando manobras hemostáticas locais são atribuídas corretamente, o sangramento pós-operatório não está relacio-

nado ao uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Neste contexto, pesquisas informam que alterar a dose ou suspender os anticoagulantes antes de qualquer procedimento odontológicos de menor risco, acarreta eminente risco de problemas tromboembólicos que por sua vez são muito mais graves que uma hemorragia. **Conclusão:** profissionais entraram no consenso que a suspensão, ou diminuição dos anticoagulantes acarretam perigo ao paciente, é muito importante que o CD trabalhe junto ao médico responsável do paciente, para que se obtenha resultado.

Palavras-chave: Anticoagulante; Saúde bucal; Odontologia