

Paciente portador de condiloma acuminado: relato de caso

Caroline Dias,¹ Gabrielly Dobroski,¹ Monaliza de Freitas²

¹Curso de Odontologia, Universidade Iguazu, Nova Iguaçu, RJ, Brasil

²Curso de Odontologia, Universidade do Rio de Janeiro (Uerj ou UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil

caroline-dias2@hotmail.com

Objetivo: relato de caso de um paciente portador de condiloma acuminado em região de lábio inferior. É uma infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus HPV. Essas lesões localizam-se, geralmente, nas regiões genitais e com menor frequência, surgem em áreas como mucosas do nariz e da boca, laringe e conjuntivas. As lesões bucais ocorrem principalmente na mucosa labial, palato mole e freio lingual. Clinicamente apresenta uma massa exofítica, séssil, rósea, firme e bem demarcada, com projeções superficiais rombudas e curtas, os tamanhos das lesões são em média de 1 a 1,5 cm. As lesões surgem após um período de incubação de duas a oito semanas. O diagnóstico é basicamente clínico, e o tratamento consiste na remoção das lesões condilomatosas, podendo realizado simultaneamente à biópsia excisional. O uso de preservativos deve ser estimulado por ser o método mais eficaz

para a redução da transmissão, além do uso de vacinas que ajudam a diminuir a incidência de lesões causadas por HPV. **Relato de Caso:** paciente gênero masculino, 50 anos, procurou atendimento odontológico queixando-se de uma verruga no lábio. Ao exame clínico, foi observado uma lesão pedunculada, exofítica com superfície verrucosa no lábio inferior direito, com cerca de 7mm, com características clínicas compatíveis com condiloma acuminado, sendo realizada uma biópsia excisional como forma de tratamento, confirmando o diagnóstico de condiloma acuminado. e o paciente orientado quanto a lesão e seu tratamento. **Conclusão:** por ser uma lesão sexualmente transmissível a prevenção torna-se fundamental, considerando que alguns HPVs apresentarem risco de malignização.

Palavras-chave: Condiloma; HPV; Lesão.